

UCD Anamix Infant
fara aroma
Aliment Destinat unor Scopuri Medicale Speciale

Pentru regimul dietetic al tulburărilor de metabolism al ciclului ureei, al sindromului HHH (hiperamoniemie, hiperornitinemie, homocitrulinurie) și a atrofiei girata, la sugari (de la naștere - până la 12 luni) și ca suplimentare a dietei, până la vârsta de 3 ani. Pulbere ce conține un amestec de aminoacizi esențiali (cu conținut crescut de aminoacizi cu catena ramificată - BCCA), carbohidrați, grasimi, vitamine, minerale și oligoelemente. **Mențiuni importante:** Administrare enterala. Trebuie utilizat sub supraveghere medicală. Nu este adecvat ca sursa unică de nutriție. Pentru utilizare la sugari și ca suplimentare a dietei la copiii mici. Doar pentru pacienții cu tulburări de metabolism ale ciclului ureei, cu sindromului HHH (hiperamoniemie, hiperornitinemie, homocitrulinurie) și cu atrofie girata. Nu se administrează parenteral.

Precauții: Acest produs trebuie asociat cu o sursă de proteine, de exemplu laptele matern sau formule patentate pentru sugari, cu scopul de a furniza aportul de lichide și de nutrienți necesar sugarilor, în cantitățile prescrise de medic. **Mod de utilizare:** Aportul recomandat și diluția trebuie determinate doar de medic sau dietetician și depind de vârsta, greutatea și starea clinică a pacientului. Fiecare măsură are 5 g pulbere și necesită 30ml apă pentru a atinge concentrația recomandată de 15% w/v. **Preparare și administrare:** Concentrația recomandată este de 15%w/v, de exemplu 15g pulbere + 100ml apă (osmolalitate 310 mOsm/kg). Folosiți doar măsura furnizată de producător. **SĂNĂTATEA SUGARULUI DEPINDE DE GRIJA CU CARE URMĂRIȚI INSTRUCȚIUNILE DE PREPARARE ȘI ADMINISTRARE. PREPARAREA INCORECTĂ POATE DUCE LA ÎMBOLNAVIREA SUGARULUI.** Spălați-vă mâinile cu atenție și curățați zona în care veți prepara produsul. Sterilizați biberonul și tetina. Fierbeți apa 5 minute sau până când fierbătorul electric se stinge și lăsați-o la răcit cel puțin 30 minute, astfel încât să o simțiți caldă pe încheietura mâinii. Puneți cantitatea necesară de apă într-un biberon (recipient) steril. Umpleți măsura furnizată cu pulbere și îndepărtați surplusul de produs cu lama unui cuțit curat și uscat. Nu apăsați pulberea în interiorul măsurii. Folosiți doar măsura furnizată de producător. Adăugați numărul de măsuri prescrise de medic în apă. Închideți biberonul și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de a hrăni sugarul, asigurați-vă că formula preparată este la temperatura optimă, prin punerea câtorva picături pe încheietura mâinii. Agitați biberonul imediat înainte de a începe hrănirea sugarului. Formula preparată rămasă nu trebuie reîncălzită și folosită pentru următoarea masă a sugarului.

Nota importantă: Formula preparată din pulbere nu este sterilă. Formula pentru sugari trebuie preparată imediat înainte de a hrăni sugarul. A nu se folosi cuptorul cu microunde pentru a prepara formula sau pentru a o încălzi. Odata reconstituită formula, folosiți timp de maxim o ora. Intotdeauna aruncați resturile neconsumate și nu reîncălziți formula în timpul administrării. Atenționare referitoare la sănătatea dinților: Igiena dentară bună este importantă la sugari și copii, de vreme ce contactul prelungit sau frecvent al bauturilor și alimentelor cu dinții crește riscul de apariție a cariilor dentare. Asigurați-vă că dinții sunt spălați după ultima masă de seară. Solicitați sfatul unui stomatolog. Odata deschisă cutia, conținutul trebuie consumat în timp de 2 săptămâni. Intotdeauna închideți cutia după folosire. A se depozita la loc uscat și răcoros. A se consuma de preferință înainte de: vezi ambalaj. **Ingrediente:** sirop de glucoză, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu conținut oleic crescut, ulei de nuca de cocos, ulei de rapita, ulei de floarea soarelui), L-Leucina, citrat de potasiu, fosfat de calciu, hidrociorura de L-Lizina, L-Valina, L-Izoleucina, emulgator - esteri ai acidului citric cu mono- și digliceride ai acizilor grași, L-Treonina, L-Tirozina, acetat de magneziu, bitartrat de colina, clorura de sodiu, L-Fenilalanina, fosfat hidrogenat de sodiu, glicerofosfat de calciu, L-Histidina, L-Triptofan, ulei cu conținut crescut de acid docosahexaenoic din *Cryptocodinium cohnii*, L-Cistina, L-Metionina, ulei cu conținut crescut de acid arahidonic din *Mortierella alpina*, sucroza, inozitol, Acid L-ascorbic, antioxidanți (lecitina din floarea soarelui, palmitat de ascorbil), taurina, sulfat feros, sulfat de zinc, L-Carnitina, DL- α -tocoferol acetat, D-pantotenat de calciu, nicotinamida, sulfat de cupru, hidrociorura de tiamina, hidrociorura de piridoxina, riboflavina, acetat de retinil, iodura de potasiu, sulfat de mangan, acid folic, clorura de crom, fitomenadiona, selenit de sodiu, molibdat de sodiu, D-biotina, colecalciferol, ciancobalamina.

Declaratie nutritionala:

	Per 100g	Per 100ml
Valoare energetica	2058kJ/492kcal	309kJ/74kcal
Echivalent proteic*	7.5g	1.1g
din care L-Cistina	0.27g	40.5mg
L-Histidina	0.32g	47.7mg
L-Isoleucina	1.40g	210mg
L-Leucina	2.40g	360mg
L-Lizina	1.20g	180mg
L-Metionina	0.25g	37.3mg
L-Fenilalanina	0.42g	62.8mg
L-Treonina	0.99g	148mg
L-Triptofan	0.30g	44.7mg
L-Tirozina	0.77g	115mg
L-Valina	1.40g	210mg
Carbohidrati	56.5g	8.5g
din care zaharuri	5.2g	0.78g
Lipide	26.4g	4.0g
din care saturate	10.5g	1.6g
mononesaturate	11.7g	1.8g
polinesaturate	4.3g	0.64g
Acid linoleic (LA)	3.44g	516mg
Acid α -linolenic (ALA)	0.35g	52.0mg
Acid arahidonic (ARA)	0.13g	18.8mg
Acid docosahexaenoic (DHA)	0.13g	18.8mg
Fibre	-	-
Sare	0.74g	0.11g
Minerale si oligoelemente		
Sodiu	295 mg	44.3 mg
Potasiu	713 mg	107 mg
Clor	530 mg	79.5 mg
Calciu	670 mg	101 mg
Fosfor	442 mg	66.3 mg
Magneziu	73 mg	11 mg
Fier	8.70 mg	1.31 mg
Zinc	6.10 mg	0.92 mg
Cupru	0.45 mg	0.068 mg
Mangan	0.031 mg	0.005 mg
Molibden	12.9 μ g	1.94 μ g
Seleniu	18.7 μ g	2.81 μ g
Crom	14.8 μ g	2.22 μ g
Iod	99.4 μ g	14.9 μ g

Vitamine

Vitamina A	431 µg-RE	64.7 µg-RE
Vitamina D3	11.8 µg	1.77 µg
Vitamina E	13.2 mg (11.7 mg TE/ET)	1.99 mg (1.76 mg TE/ET)
Vitamina K1	40 µg	6 µg
Vitamina B1	0.54 mg	0.08 mg
Vitamina B2	0.54 mg	0.08 mg
Niacina	2.5 mg (7.47 mg NE/EN)	0.38 mg (1.12 mg NE/EN)
Acid pantotenic	3 mg	0.45 mg
Vitamina B6	0.54 mg	0.08 mg
Acid folic	58.1 µg	8.72 µg
Folat	96.8 µg	14.5 µg
Vitamina B12	1.3 µg	0.2 µg
Biotina	19.3 µg	2.9 µg
Vitamina C	51.5 mg	7.73 mg

Altele

L-Carnitina	10 mg	1.5 mg
Colina	154 mg	23.1 mg
Inozitol	104 mg	15.5 mg
Taurina	40 mg	6 mg
Osmolalitate (la dilutia recomandata de 15%)	310 mOsm/kg	310 mOsm/kg

*Converto: 1g proteine = 1.2g aminoacizi = 17kJ = 4kcal

Ambalaj: cutie metalică x 400G. Ambalat într-o atmosferă protectivă. **Produs** în Marea Britanie de SHS International ltd. **Distribuitor:** Nutrient Solutions SRL, Str. Barbu Mumuleanu, Nr.30-32, Spatiu E1-2, Etaj 1, Sector 2, Cod poştal 020544, Bucuresti, Tel: 0212105642, 0727737646; Fax: 021/2100689; office@nutrient.ro .